

# Fodermajs

	<u>Preparat/dos per ha</u>	<u>Behandlingstidpunkt</u>	<u>Övrig information</u>
Örtogräs	0,5-0,75 lit Callisto <sup>1</sup> <b>följt av</b> 0,5-0,75 lit Callisto <sup>1</sup>	Från stadiet 11 Ogräsen hjärtblad  Senast stadiet 18 10-12 dagar efter första behandlingen	Växtföljdsrestriktioner se nedan
<u>Kan kompletteras med:</u>			
Hirs, näva mfl örtogräs	0,5 lit Onyx	Stadie 12-16	Kan upprepas
Näva mfl örtogräs	11,25 gr Harmony + 0,1 lit vätmedel <b>följt av</b> 7,5 gr Harmony + 0,1 lit vätmedel	Från stadiet 12  Senast stadiet 16	
Åkerbinda mfl örtogräs	0,15 lit Starane 333	Stadie 13-16	
Div gräsogräs	50 gr MaizTer+ 0,63 lit MaizOil <b>följt av</b> 50 - 100 gr MaizTer+ 0,63-1,25 lit MaizOil	Från stadiet 12  Senast stadiet 18	Kan upprepas

- 1) Totalt max 1,5 lit Callisto / ha vart annat år eller max 1,0 lit Callisto varje år
- Efter Callisto kan höst eller vårspannmål odlas. Innan våroljeväxter krävs plöjning. Sockerbetor, ärter, bönor eller grönsaker kan inte odlas efterföljande vår.

<b>Insekter</b>			
Fritflugor	50 ml Nexide CS	Stadie 11-12	UPMA - tillåtet <b>endast</b> i sockermajs

<b>Svamp</b>			
Ögonfläck, Bladfläck	0,8-1,0 Comet Pro <b>eller</b> 0,8-1,0 lit Propulse	Stadie 30-65  Stadie 33-69	Majs ca 100-120 cm  Max 0,5 lit före stadiet 40

<b>Växtnäringsbrist:</b>	
Manganbrist	0,75-1,0 lit Norotec Mn
Borbrist	2,0-3,0 lit Bor 150
Allmän näringsbrist	3,0-4,0 lit MicroTop