

# Höstkorn - vår

	<u>Preparat/dos per ha</u>	<u>Behandlingstidpunkt</u>	<u>Övrig information</u>
<b>Ogräs:</b>			
Veronika/viol	0,15-0,2 lit Legacy <sup>1</sup>	Tidigt vid tillväxt start	Om ej höstbehandlat
Åkerven, flyghavre renkavle	1,0 lit Event Super + 0,5 lit Renol	Stadie 13-30 (12 dagars intervall till fenoxisyra)	Kan blandas med Gratil/Trimmer
Som ovan + hönshirs	<b>eller</b> 0,8-1,2 lit Axial	Stadie 22-39	Höga dosen renkavle Hönshirs gror sent
Örtogräs(bred effekt)	11,25-15gr Trimmer + 0,75-1,0 lit Primus XL + 0,1 lit Vätmedel	Stadie 30-39	Blanda inte Primus XL med svampmedel som innehåller azoler
	<b>eller</b> 15-20 gr Gratil + 11,25-15gr Trimmer + 0,1 lit Vätmedel	Stadie 13-39	
Snärjmåra	0,75-1,0 lit Primus XL	Stadie 30-39	Temp > 5°C
Tistel	25 gr CDQ + 1 lit Metaxon 750 + 0,1 lit Vätmedel	Stadie 30-39	Ej insådd Växtföljdsrestriktioner !!

Not 1: Efter våranvändning av Legacy krävs jordbearbetning före sådd av höstraps

<b>Svamp:</b>			
Mjöldagg	0,35-0,5 lit Leander	Stadie 30-65	<b>Generellt gäller:</b> *Behandla tidigt vid begynnande angrepp. *Dos beroende på angreppsgrad och önskad effektid *Låga doser kan behöva upprepas *Vid etablerade angrepp av mjöldagg tillsätt Leander
Bladfläcksjuka, Sköldfläcksjuka, Mjöldagg, Rost, mfl	0,3-0,5 lit Prosaro EC250	Stadie 30-61	
	<b>eller</b> 0,5-0,75 lit Elatus Era	Stadie 31-59	
	<b>eller</b> 0,6-0,75 lit Ascra Xpro	Stadie 30-61	
	<b>eller</b> 0,75-1,25 lit Avastel	Stadie 30-65	
Axfusarios	0,5 lit Patel 300 EC	Stadie 65	35 dagar karens

<b>Insekter:</b>			
Trips, sädesbladbagge, löss, mfl	0,2 lit Mavrik <b>eller</b>	Stadie 10-75	Max 2 beh på våren Max 1 beh per säsong
	0,05 lit Nexide CS	Stadie 12-75	
Bladlöss	100-140 gr Teppeki	Stadie 21-77	Max 1 beh

<b>Växtnäringsbrist:</b>			
Manganbrist	0,75-1,0 lit Norotec Mn		
Kopparbrist	0,5 lit Norotec Koppar		
Allmän näringsbrist	3,0-4,0 lit MicroTop		