

Höstoljeväxter (höst)

	<u>Preparat/dos per ha</u>	<u>Behandlingstidpunkt</u>	<u>Övrig information</u>
Ogräs:			
Direktsådd raps:	Vid behov börja med Glyphosat-behandling 3-4 dagar före sådd		
Ört och gräsogräs	2,1 lit Devrinol	Före/efter sådd (men före uppkomst)	Restriktioner efter- följande gröda
	eller 0,33 lit Centium och / eller 2,25 lit Gajus	< 3 dag efter sådd Stadie 11-14	God markfukt gynnar effekten
Örtogräs	0,25-0,33 lit Centium och/eller	< 3 dag efter sådd	God markfukt gynnar effekten.
	0,25 lit Belkar eller	Stadie 12-14	Tidig enkelbehandling
	0,25 lit Belkar följt av	Stadie 12-14	Dubbelbehandling
	0,25 lit Belkar eller 0,5 lit Belkar	Stadie 16-30 Stadie 16-30	Minst 3 veckors intervall mellan behandlingarna Sen enkelbehandling
Spillsäd, åkerven	0,5-1,0 lit Agil eller		Spillsäd 2-3 blad De lägre doserna mot liten spillsäd
Som ovan + gröe, renkavle	0,6-1,0 lit Select Plus	Stadie 12-15 Senast 1:a oktober	Som ovan dock max 1 beh per år Full dos om renkavle

Insekter			
Rapsjordloppa	0,2 lit Mavrik eller 0,06 lit Nexide CS	Stadie 10-19	Max 1 beh i stadie 10-19 Max 1 beh per år
Sniglar	4,0-7,0 kg SluXX HP	Förebyggande behandl. Vid etablerade angrepp välj den högre dosen	Direktsådd, kokig jord- struktur, hög fuktighet ökar angreppsrisken Upprepas vid behov

Svamp	0,5 lit Folicur Xpert	Stadie 14-20	
Tillväxtreglering	0,7-1,0 lit Caryx	Stadie 14-16	

Växtnäringsbrist:			
Manganbrist	0,75-1,0 lit Norotec Mn		
Svavelbrist	5-6 kg Svavelnäring		
Borbrist	2-3 lit Bor 150		
Allmän brist	2-4 lit YaraVita Canola Bio		Ej blandbar med Mavrik