

Potatis (ej färskpotatis)

Betning	250 ml Maxim per ton utsäde	(fallande knöl vid sättnig)
	eller 0,2 lit Allstar per ton utsäde	(fallande knöl vid sättnig)

	<u>Preparat/dos per ha</u>	<u>Behandlingstidpunkt</u>	<u>Övrig information</u>
Ogräs			
Örtogräs	0,35 lit Sencor SC + 0,25 lit Spotlight Plus vid behov följt av 0,23 lit Sencor SC eller 1,75 lit Fenix + 0,35 lit Sencor SC	Före/vid uppkomst Efter uppkomsten Ca 5 cm hög blast 2-4 dag före uppkomst	Glyfosat alt Mizuki alt Spotlight Plus kan tillsättas <u>före</u> uppkomst Beakta sortskillnader vid Sencor-behandlingar efter uppkomst. Markfukt gynnar effekten
Örtogräs (nattskatta)	0,35 lit Sencor SC+ 4,0 lit Boxer eller 0,35 lit Sencor SC+ 2,0 lit Boxer följt av 2,0 lit Boxer eller 0,35 lit Sencor SC+ 0,25 lit Centium eller 2,0 lit Proman + 0,25 lit Spotlight Plus eller 2,0 lit Proman + 0,15-0,25 lit Centium	Före uppkomst Före uppkomst Efter uppkomst. OBS! Helt torra blad vid beh. Senast 5 dag före uppkomst. Före uppkomst Senast 5 dag före Uppkomst	Markfukt gynnar effekten Delad Boxerbehandling är att föredra vid torka Upprepa när ny nattskatta har hjärtblad Markfukt gynnar effekten Markfukt gynnar effekten
Örtogräs (kvickrot, tistel, gråbo)	0,35 lit Sencor SC + 0,25 lit Spotlight Plus följt av 30-50 gr Titus + 0,2 lit Vätmedel	Före/vid uppkomst Stadie 20-30	Glyfosat alt Mizuki alt Spotlight Plus kan tillsättas <u>före</u> uppkomst Växtföljdsrestriktioner! 50 gr Titus om stora örtogräs eller gräs, tistel, gråbo
Kvickrot mfl gräsogräs	1,5 lit Agil eller 1,5-2,0 lit Select Plus eller 50 gr Titus + 0,2 lit Vätmedel	< stadie 68 Stadie 12-33 Stadie 20-30	Kvickroten 3-5 blad 7 dagars intervall till annan behandling Växtföljdsrestriktioner!
Virus	2,5% Fibro	Upprepas med en veckas intervall	200 lit vatten/ha Ökas successivt med blasttillväxten