

Potatis forts. (ej färskpotatis)

| <u>Preparat</u> | <u>Dos per ha</u> | <u>Bladmögelbehandling</u> | | |
|-----------------|-------------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| | | <u>Intervall</u> | <u>Karenstid</u> | <u>Funktion</u> |
| Cymbal* | 0,25 kg | 5-7 dagar | 7 dagar | Lok.sys |
| Evagio Forte | 0,6 lit | 7-10 dagar | 7 dagar | Kontakt+translaminär |
| Infito | 1,6 lit | 7-10 dagar | 7 dagar | System+translaminär |
| Proxanil** | 2,0-2,5 lit | 7 dagar | 14 dagar | System+translaminär |
| Revus Top** | 0,6 lit | 7-10 dagar | 3 dagar | Lok.sys+Kontakt |
| Shirlan | 0,4 lit | 7-10 dagar | 7 dagar | Kontakt |
| Raport* | 1,4 lit | 7 dagar | 14 dagar | Systemisk |
| Zorvec Enicade* | 0,15 lit | 7-10 dagar | 7 dagar | System+translaminär |

*) Cymbal, Rapport och Zorvec Enicade skall alltid blandas med ett kontaktverkande preparat.

***) Bör blandas med annan produkt / verkningsmekanism

Intervall och preparatval styrs av väderlek och tillväxthastighet. I vissa fall kan kortare intervall krävas för att erhålla god effekt. Starta behandlingsprogrammet tidigt och utför all behandling på torr blast. Beakta karenstiderna i slutet av säsongen.

| <u>Preparat</u> | <u>Dos per ha</u> | <u>Alternariabehandling</u> | |
|-----------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| | | <u>Normal behandl.period</u> | <u>Karenstid</u> |
| Revus Top | Max 3 X 0,6 lit | Slutet Juni – t o m Aug | 3 dagar |
| Amistar | Max 2 X 0,5 lit | Mitten Juli – t.o.m Aug | 14 dagar |
| Narita | Max 3 X 0,4 lit | Mitten Juli – t.o.m Aug | 14 dagar |
| Propulse | Max 2 X 0,45 lit | Mitten Juli – t.o.m Aug | 21 dagar |
| Revyona | Max 2 X 1,25 lit | Mitten Juli – t.o.m Aug | 3 dagar |

| <u>Insekter:</u> | | |
|-----------------------|---|--|
| Stritar, stinkfly mfl | 0,2 lit Mavrik eller 150-250 gr Mospilan | Max 2 behandlingar per år Max 2 behandlingar (vart annat år) |
| Blادلöss | 160 gr Teppeki eller 0,2 lit Mavrik | Max 1 behandling per år Max 2 behandlingar per år Endast kontaktverkan |

| <u>Blastdödning:</u> | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
| Avmognande blast alt blastkrossning | 1,0 lit Spotlight Plus eller | 2-3 dag efter ev blastkrossning | Morgon/förmiddag (gäller även nedanstående alt) |
| | 2,0 lit Mizuki | | 1-2 lit Renol ökar effekten |
| Kraftig blast utan krossning | 2,0 lit Mizuki följt av 2,0 lit Mizuki | From st 50 > 5 dag intervall | 1-2 lit Renol ökar effekten 1-2 lit Renol ökar effekten |
| OBS Spotlight Plus: får endast användas en gång per år – antingen mot ogräs eller blastdödning Mizuki: max totaldos (ogräs + blastdödning) är 4 lit/ha | | | |

| <u>Växtnäringsbrist:</u> | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Manganbrist | 0,75-1,0 lit Norotec Mn | Upprepas vid behov |
| Borbrist | 2,0-3,0 lit Bor 150 | |
| Magnesium/Fosforbrist | 5,0-6,0 lit Magnofoss | Upprepas vid behov |
| Allmän näringsbrist | 3,0-4,0 lit MicroTop | Upprepas vid behov |